

レジメン名 FOLFIRI+アービタックス(2回目以降) 1クール14日

RP	手技	薬剤名	用量	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)
注射用抗がん薬及び支持療法薬(day1~day3)							
1	点滴静注	グラニセトロン注 デキサート注射液 ボララミン注	1mg/50mL 1本 1.65mg 6A 5mg 1A	day1	9:30	末梢メイン1	30min
2	点滴静注	アービタックス注 生理食塩水	250mg/m ² 250mL	day1	10:00	末梢メイン1	60min
3	点滴静注	生理食塩水	50mL	day1	11:00	末梢メイン1	60min
4	点滴静注	レボホリナート点滴静注 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	day1	12:00	末梢側管1	120min
5	点滴静注	イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150mg/m ² 250mL	day1	12:00	末梢メイン1	90min
6	点滴静注	フルオロウラシル注 生理食塩水	400mg/m ² 100mL	day1	14:00	末梢側管1	10min
7	点滴静注	フルオロウラシル注 生理食塩水	2400mg/m ² 50mL	day1 ~ day3	14:10	末梢メイン1	46時間持続
8	点滴静注	生理食塩水	20mL	day3	12:10	末梢メイン1	フラッシュ用

注射用抗がん薬及び支持療法薬(day8)							
1	点滴静注	生理食塩水 デキサート注射液 ボララミン注	50mL 1.65mg 4A 5mg 1A	day8	9:30	末梢メイン1	30min
2	点滴静注	アービタックス注 生理食塩水	250mg/m ² 250mL	day8	10:00	末梢メイン1	60min
3	点滴静注	生理食塩水	50mL	day8	11:00	末梢メイン1	60min