

## レジメン名 FOLFIRI

1クール14日

| RP                        | 手技   | 薬剤名                    | 用量                            | 投与日               | 投与時刻  | 投与経路   | 投与時間(分) |
|---------------------------|------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|
| 注射用抗がん薬及び支持療法薬(day1~day3) |      |                        |                               |                   |       |        |         |
| 1                         | 点滴静注 | グラニセトロン注<br>デキサート注射液   | 1mg/50mL 1本<br>1.65mg 6A      | day1              | 9:30  | 末梢メイン1 | 30min   |
| 2                         | 点滴静注 | レボホリナート点滴静注<br>5%ブドウ糖液 | 200mg/m <sup>2</sup><br>250mL | day1              | 10:00 | 末梢側管1  | 120min  |
| 3                         | 点滴静注 | イリノテカン注<br>5%ブドウ糖液     | 150mg/m <sup>2</sup><br>250mL | day1              | 10:00 | 末梢メイン1 | 90min   |
| 4                         | 点滴静注 | フルオロウラシル注<br>生理食塩水     | 400mg/m <sup>2</sup><br>100mL | day1              | 12:00 | 末梢側管1  | 10min   |
| 5                         | 点滴静注 | フルオロウラシル注<br>生理食塩水     | 2400mg/m <sup>2</sup><br>50mL | day1<br>~<br>day3 | 12:10 | 末梢メイン1 | 46時間持続  |
| 6                         | 点滴静注 | 生理食塩水                  | 20mL                          | day3              | 10:10 | 末梢メイン1 | フラッシュ用  |