

レジメン名 FOLFOXIRI+ベバシズマブ

1クール14日

RP	手技	薬剤名	用量	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)
注射用抗がん薬及び支持療法薬(day1~day3)							
1	点滴静注	グラニセロン注 デキサート注	1mg/50ml 1本 1.65mg 6A	day1	9:30	末梢メイン1	30min
2	点滴静注	ベバシズマブ注 生理食塩水	5mg/kg 100mL	day1	10:00	末梢メイン1	初回90分 2回目60分 3回目以降30分でも可
3	点滴静注	イリノテカン注 5%ブドウ糖液	165mg/m ² 250mL	day1	11:30	末梢メイン1	60min
4	点滴静注	レボホリナート点滴静注 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	day1	12:30	末梢側管1	120min
5	点滴静注	オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	day1	12:30	末梢メイン1	120min
6	点滴静注	フルオロウラシル注 生理食塩水	3200mg/m ² 50mL	day1 ~ day3	14:30	末梢メイン1	48時間持続
7	点滴静注	生理食塩水	20mL	day3	14:30	末梢メイン1	フラッシュ用

RP	薬剤名	用量・用量	投与日	投与時刻
経口抗がん薬及び支持療法薬				
1	アプレピタントカプセル	125mg	1Cap	day1 10:00
2	アプレピタントカプセル	80mg	1Cap	day2 10:00
				day3 10:00
3	デカドロン	0.5mg	8錠	day2~day3 朝食後
4	デカドロン	0.5mg	8錠	day2~day3 昼食後