

レジメン名 FOLFOX+ベバシズマブ（大腸癌） 1クール14日

RP	手技	薬剤名	用量	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)
注射用抗がん薬及び支持療法薬(day1~day3)							
1	点滴静注	グラニセトロン注 デキサート注射液	1mg/50mL 1本 1.65mg 6A	day1	9:30	末梢メイン1	30min
2	点滴静注	ベバシズマブ注 生理食塩水	5mg/kg 100mL	day1	10:00	末梢メイン1	初回90分 2回目60分 3回目以降 30分でも可
3	点滴静注	レボホリナート点滴静注 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	day1	11:30	末梢側管1	120min
4	点滴静注	オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	day1	11:30	末梢メイン1	120min
5	点滴静注	フルオロウラシル注 生理食塩水	400mg/m ² 100mL	day1	13:30	末梢側管1	10min
6	点滴静注	フルオロウラシル注 生理食塩水	2400mg/m ² 50mL	day1 ~ day3	13:40	末梢メイン1	46時間持続
7	点滴静注	生理食塩水	20mL	day3	11:40	末梢メイン1	フラッシュ用