

# レジメン名 イミフィンジ+GC

# 1クール21日

RP	手技	薬剤名	用量	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)
注射用抗がん薬及び支持療法薬							
1	点滴静注	生理食塩液	50mL	Day1	9:30	末梢メイン1	30min
2	点滴静注	イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg 250mL	Day1	10:00	末梢メイン1	60min
3	点滴静注	生理食塩液	50mL	Day1	11:00	末梢メイン1	10min
4	点滴静注	フィジオ140輸液 硫酸Mg補正液20mEq/mL	500mL 1A	Day1	11:10	末梢メイン1	60min
5	点滴静注	フィジオ140輸液	500mL	Day1	12:10	末梢メイン1	60min
6	点滴静注	グラニセロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 1本 1.65mg 6A	Day1	12:10	末梢側管1	30min
7	点滴静注	マンニトール注射液20%	300mL	Day1	12:40	末梢側管1	30min
8	点滴静注	シスプラチン注 生理食塩液	25mg/m <sup>2</sup> 250mL	Day1	13:10	末梢側管1	60min
9	点滴静注	フィジオ140輸液	500mL	Day1	14:10	末梢メイン1	60min
10	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注液 生理食塩液	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	Day1	14:10	末梢側管1	30min
11	点滴静注	生理食塩液	20mL	Day1	14:40	末梢側管1	フラッシュ用
12	点滴静注	フィジオ140輸液 硫酸Mg補正液20mEq/mL	500mL 1A	Day8	9:00	末梢メイン1	60min
13	点滴静注	フィジオ140輸液	500mL	Day8	10:00	末梢メイン1	60min
14	点滴静注	グラニセロン点滴静注 デキサート注射液	1g/50mL 1本 1.65mg 6A	Day8	10:00	末梢側管1	30min
15	点滴静注	マンニトール注射液20%	300mL	Day8	10:30	末梢側管1	30min
16	点滴静注	シスプラチン注 生理食塩液	25mg/m <sup>2</sup> 250mL	Day8	11:00	末梢側管1	60min
17	点滴静注	フィジオ140輸液	500mL	Day8	12:00	末梢メイン1	60min
18	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注液 生理食塩液	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	Day8	12:00	末梢側管1	30min
19	点滴静注	生理食塩液	20mL	Day8	12:30	末梢側管1	フラッシュ用

RP	薬剤名	用量・用量	投与日	投与時刻
経口抗がん薬及び支持療法薬				
1	アプレピタントカプセル	125mg	1cap	Day1,8
2	アプレピタントカプセル	80mg	1cap	Day2~3,9~10