

レジメン名

TS-1+CDDP療法（胃がん） 1クール35日

RP	手技	薬剤名	用量/単位	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)	
注射用抗がん薬及び支持療法薬(day7~day10)								
1	点滴静注	フィジオ140	500mL	day7	16:00	末梢メイン1	360min	
		フィジオ140	500mL		22:00		360min	
2	点滴静注	フィジオ140	500mL	day8	4:00	末梢メイン1	300min	
		硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL					1A
3	点滴静注	生理食塩水	50mL	day8	9:00	末梢メイン1	30min	
		アロキシ静注	0.75mg					1V
		デキサート注射液	1.65mg					6A
4	点滴静注	生理食塩水	50mL	day9 ~ day10	9:30	末梢メイン1	30min	
		デキサート注射液	1.65mg					4A
5	点滴静注	マンニトール20%	300mL	day8	9:30	末梢メイン1	30min	
6	点滴静注	シスプラチン注射液	60mg/m ²	day8	10:00	末梢メイン1	120min	
		テルモ生食注	500mL					
7	点滴静注	フィジオ140	500mL	day8	12:00	末梢メイン1	120min	
		フィジオ140	500mL	day8	14:00	末梢メイン1	120min	
8	点滴静注	フィジオ140	500mL	day8	16:00	末梢メイン1	120min	
9	点滴静注	生理食塩水	20mL	day8	18:00	末梢メイン1	ロック用	
10	点滴静注	ソルテム3A	500mL	day9	10:00	末梢メイン1	240min	
11	点滴静注	生理食塩水	20mL	day9	14:00	末梢メイン1	ロック用	

RP	薬剤名	用量・用量	投与日	投与時刻	
経口抗がん薬及び支持療法薬					
1	イメンド	125mg	1Cap	day8	10:00
2	イメンド	80mg	1Cap	day9	10:00
				day10	10:00
3	TS-1	BSA<1.25 m ² : 80mg/day 1.25m ² <BSA<1.5m ² :100mg/day BSA>1.50m ² :120mg/day		day1~day21	朝夕食後