

レジメン名

XP療法（胃がん） 1クール21日

| RP | 手技 | 薬剤名 | 用量/単位 | 投与日 | 投与時刻 | 投与経路 | 投与時間(分) | |
|---------------------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|--------|---------|----|
| 注射用抗がん薬及び支持療法薬(day0~day3) | | | | | | | | |
| 1 | 点滴静注 | フィジオ140 | 500mL | day0 | 16:00 | 末梢メイン1 | 360min | |
| | | フィジオ140 | 500mL | | 22:00 | | 360min | |
| 2 | 点滴静注 | フィジオ140 | 500mL | day1 | 4:00 | 末梢メイン1 | 300min | |
| | | 硫酸Mg補正液20mEq/20mL | 20mL | | | | | 1A |
| 3 | 点滴静注 | 生理食塩水 | 50mL | day1 | 9:00 | 末梢メイン1 | 30min | |
| | | アロキシ静注 | 0.75mg | | | | | 1V |
| | | デキサート注射液 | 1.65mg | | | | | 6A |
| 4 | 点滴静注 | 生理食塩水 | 50mL | day2 ~ day3 | 9:30 | 末梢メイン1 | 30min | |
| | | デキサート注射液 | 1.65mg | | | | | 4A |
| 5 | 点滴静注 | マンニトール20% | 300mL | day1 | 9:30 | 末梢メイン1 | 30min | |
| 6 | 点滴静注 | シスプラチン注射液 | 80mg/m ² | day1 | 10:00 | 末梢メイン1 | 120min | |
| | | テルモ生食注 | 500mL | | | | | |
| 7 | 点滴静注 | フィジオ140 | 500mL | day1 | 12:00 | 末梢メイン1 | 120min | |
| | | フィジオ140 | 500mL | day1 | 14:00 | 末梢メイン1 | 120min | |
| 8 | 点滴静注 | フィジオ140 | 500mL | day1 | 16:00 | 末梢メイン1 | 120min | |
| 9 | 点滴静注 | 生理食塩水 | 20mL | day1 | 18:00 | 末梢メイン1 | ロック用 | |
| 10 | 点滴静注 | ソルテム3A | 500mL | day2 | 10:00 | 末梢メイン1 | 240min | |
| 11 | 点滴静注 | 生理食塩水 | 20mL | day2 | 14:00 | 末梢メイン1 | ロック用 | |

| RP | 薬剤名 | 用量・用量 | 投与日 | 投与時刻 | |
|---------------|--------|--------------------------|------|------------|-------|
| 経口抗がん薬及び支持療法薬 | | | | | |
| 1 | イメンド | 125mg | 1Cap | day1 | 10:00 |
| 2 | イメンド | 80mg | 1Cap | day2 | 10:00 |
| | | | | day3 | 10:00 |
| 3 | カベシタピン | 1000mg/m ² /回 | | day1~day14 | 朝夕食後 |